

DISEKVOJANTIS ALKŪNĖS SĄNARIO OSTEOCHONDRITAS INFORMACIJA APIE SUSIRGIMĄ



APIBŪDINIMAS

Osteochondritas yra sutrikimas, kurio metu kremzlė virsta kaulu, paliekant sąnario paviršiuje sustorėjusi kremzlės lopą.


Ši liga gali pasireikšti alkūnės sąnaryje, kai nuo kaulo atsiskiria silpna, nenormali kremzlė, paliekanti fragmentus sąnario ertmėje.

Dažniausiai susergera stambių veislių šunys augimo metu, pasirodžius pirmiesiems simptomams nuo 5 iki 7 mėnesių amžiaus.



SVEIKA ALKŪNĖ

- Sveikas peties sąnarys yra lygus, kremzlė plona.
- Sąnario ertmėje nėra kremzlės fragmentų.
- Normali sąnario struktūra palengvina normalią sąnario funkciją be klinikinių skausmo požymių.



DISEKVOJANTIS ALKŪNĖS OSTEOCHONDRITAS

- Sergant osteochondritu, sustorėjęs kremzlės plotas tampa silpnas ir pažeidžiamas.
- Kremzlės paviršiuje atsiranda įtrūkimų, pažeistos kremzlės fragmentai gali atsiskirti ir plūduriuoti sąnario ertmėje.
- Ši liga vėliau gali sukelti osteoartritą.

DISEKUOJANTIS ALKŪNĖS OSTEOCHONDRITAS

KLINIKINIAI POŽYMIAI

- Lėtinis arba ūmus priekinių galūnių šlubavimas, kuris pasunkėja po mankštos.
- Po poilsio laikotarpio šuo būna nelankstus, sustingęs.
- Vaikščiojimas gali atrodyti priverstinis; šuo stengiasi dėti trumpesnius žingsnius.
- Šuo prasčiau lanksto alkūnę.

GYDYMO GALIMYBĖS

Disekuojančiu osteochondritu sergantys šunys gali būti gydomi medikamentais, tačiau jei chirurginis laisvų fragmentų sąnaryje šalinamas yra atidėliojamas, jie gali toliau gadinti kremzlę.

Nechirurginis gydymas

- Svorio kontrolė yra gyvybiškai svarbi, nes šuniui, turinčiam antsvorio, gali paspartėti osteoartrito pradžia ir progresavimas.
- Priešuždegiminiai vaistai, skiriami mažinti sąnario skausmą ir uždegimą, taip pagerinant šuns gyvenimo kokybę.
- Maisto papildai gali būti skiriami prie dietos skirtingais tikslais. Gliukozaminas su chondroitino sulfatu stiprina sąnario kremzlę. Omega-3 riebalų rūgštys turi priešuždegiminių savybių.
- Kontroliuojami pratimai riboja skausmą ir padeda stiprinti aplinkinius raumenis. Pratimai turėtų būti ribojami, kol šlubumas sumažės ir prižiūrint, bei kontroliuojant pratimų kiekis didinamas.

Chirurginės operacijos tikslai:

- Pašalinti atsipalaidavusius kremzlės fragmentus.
- Skatinti sąnario kremzlės atsistatymą, sulėtinti degeneracinį procesą.

Jei operacija rekomenduojama, ji turėtų būti atlikta kuo greičiau norint sumažinti osteoartrito riziką.



Chirurginis gydymas

PATARIMAI AUGINTOJAMS

- Kasdienė fizioterapija, paskirta jūsų veterinarijos gydytojo, įskaitant švelnius, trumpus pratimus yra naudinga jūsų šuniui. Tai pagerins pažeistos galūnės mobilumą.
- Kontroliuokite savo šuns svorį naudodami tinkamą aukštos kokybės dietą. Kalorijų ribojimas būtinas norint palaikyti šuns sąnarių sveikatą ir bendrą savijautą.
- Savo šuniui galite padėti naudodami petnešas, kurios suteikia jiems papildomą paramą ir pagalbą pasivaikščiojimų metu.
- Aplinkos pritaikymas, pvz.: patogus guolis miegoti, kilimėlis ant slidžių grindų ir rampa ar laipteliai įlipti į automobilį. Šie pakeitimai palengvins kasdienę veiklą jūsų šuniui.
- Nepamirškite taikyti medikamentinį gydymą, kad sumažintumėte skausmą ir uždegimą bei pagerintumėte jūsų šuns gyvenimo kokybę.

Prašome pasikonsultuoti su savo veterinarijos gydytoju dėl diagnozės patvirtinimo ar gydymo.