

LOSSE PROCESSUS CORONOIDEUS (LPC) INFORMATIEBLAD



NAAM

LEEFTIJD

GEWICHT


RAS

DATUM

VOLGENDE BEZOEK

BESCHRIJVING

Het processus coronoideus is een klein stukje bot dat deel uitmaakt van de onderrand van de kom van het ellebooggewricht. Het kan losraken van de rest van het bot, wat pijn en ontsteking veroorzaakt. We spreken dan van een 'losse processus coronoideus' (LPC). Deze aandoening treft meestal grote hondenrassen. Manken kan optreden tussen de leeftijd van 5 en 7 maanden. Soms wordt een LPC pas op latere leeftijd opgemerkt wanneer de hond last krijgt van artrose.



NORMALE ELLEBOOG

- In een gezond ellebooggewricht is het kraakbeen egaal en dun.
- Het processus coronoideus zit vast aan de ellepijp.
- Een normale gewrichtsstructuur bevordert een goede gewrichtsfunctie, zonder dat de hond tekenen van pijn laat zien.



LOSSE PROCESSUS CORONOIDEUS

- Bij een losse processus coronoideus is dit stukje bot ingescheurd of helemaal losgekomen, waardoor het vrij kan bewegen en het kraakbeen in het gewricht kan beschadigen.
- Vanwege de aantasting van het kraakbeen en de daaropvolgende veranderingen in het gewricht, krijgt de hond artrose. Dit veroorzaakt pijn en ontsteking.

LOSSE PROCESSUS CORONOIDEUS (LPC)

SYMPTOMEN

- Plots of langdurig manken op de voorpoot dat verergert bij inspanning.
- 's Ochtends vroeg en na rust heeft de hond last van stijve gewrichten.
- Deze symptomen kunnen ook volgen op een letsel/foute beweging.



BEHANDELOPTIES

Niet-operatieve behandeling

- **Gewichtscontrol**e is essentieel aangezien artrose sneller optreedt en verergert bij honden met overgewicht.
- **Ontstekingsremmers/pijnstillers** worden gebruikt om pijn en ontsteking in het gewricht te verminderen, waardoor de levenskwaliteit van uw hond verbetert.
- **Voedingssupplementen** kunnen aan het voer worden toegevoegd voor verschillende doeleinden.

Er kan gekozen worden voor een niet-operatieve behandeling. Echter, een los fragment dat niet operatief verwijderd wordt, kan het kraakbeen blijven beschadigen.

Operatieve behandeling

- **Verwijdering van de losse processus coronoideus:** hierbij wordt het botfragment dat bijdraagt aan de pijn en ontsteking, operatief verwijderd.

Uw dierenarts zal met u bespreken of uw hond een operatie nodig heeft of niet.

TIPS VOOR DE EIGENAAR

- Geef uw hond de medische behandeling zoals voorgeschreven door uw dierenarts om pijn en ontsteking te verminderen en de levenskwaliteit van uw hond te verbeteren.
- Dagelijkse korte, voorzichtig uitgevoerde bewegingsoefeningen op advies van uw dierenarts zijn gunstig voor uw hond omdat ze de mobiliteit van het getroffen gewricht kunnen verbeteren.
- Voorkom dat uw hond te zwaar wordt. Hoogwaardige voeding en beperkte calorie-inname is essentieel voor het behoud van de gezondheid van gewrichten en het algemene welzijn van uw hond.
- Om uw hond te helpen kunt u een speciaal tuigje gebruiken, dat ondersteuning biedt tijdens het wandelen.
- Aanpassing van de leefomgeving zullen dagelijkse activiteiten voor uw hond vergemakkelijken. Zorg bijvoorbeeld voor een comfortabele slaapplek (dik, zacht kussen), een anti-slipmat op gladde vloeren en een loopplank voor de auto.

Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie over de gezondheid van de gewrichten van uw hond.