

OSTEOCHONDRITIS DISSECANS (OCD) VAN DE SCHOUDER

INFORMATIEBLAD



NAAM

LEEFTIJD

GEWICHT


RAS

DATUM

VOLGENDE BEZOEK

BESCHRIJVING

Osteochondritis is een verstoring van het natuurlijke proces waarbij kraakbeen in bot wordt omgezet. Door deze verstoring blijft er op het gewrichtsoppervlak een verdikt stuk kraakbeen achter. Osteochondritis dissecans (OCD) van de schouder houdt in dat zwak, abnormaal kraakbeen loskomt van het bot en losse fragmenten in de gewrichtsholte terechtkomen. Dit treft vooral grote hondenrassen die nog in de groei zijn. De eerste symptomen verschijnen meestal tussen 5 en 7 maanden leeftijd.



NORMALE SCHOUDER

- Een gezond schoudergewricht heeft een glad, dun kraakbeen.
- In de gewrichtsholte zijn geen kraakbeenfragmenten aanwezig.
- Een normale gewrichtsstructuur bevordert een goede gewrichtsfunctie, zonder dat de hond tekenen van pijn vertoont.



OSTEOCHONDRITIS DISSECANS VAN DE SCHOUDER

- Bij osteochondritis dissecans raakt een verdikt stukje kraakbeen verzwakt en beschadigd.
- Er ontstaan scheurtjes in het kraakbeenoppervlak en er kan een kraakbeenflap afbreken en in de gewrichtsholte terechtkomen.
- Deze aandoening kan leiden tot de ontwikkeling van artrose.

OSTEOCHONDRITIS DISSECANS (OCD) VAN DE SCHOUDER

SYMPTOMEN

- Plots of langdurig manken op een voorpoot dat erger wordt bij inspanning.
- De hond is stijver na periodes van rust.
- Lopen kan er wat geforceerd uitzien; de hond neemt verkorte passen.
- In sommige gevallen treedt manken op na een letsel/verkeerde beweging.



BEHANDELOPTIES

Niet-operatieve behandeling

- **Gewichtscontrol**e is essentieel aangezien artrose sneller optreedt en verergert bij honden met overgewicht.
- **Ontstekingsremmers/pijnstillers** worden gebruikt om pijn en ontsteking in het gewricht te verminderen, waardoor de levenskwaliteit van uw hond verbetert.
- **Fysiotherapie:** een oefenprogramma op maat kan de pijn en ontsteking in het gewricht verminderen. De hoeveelheid lichaamsbeweging moet beperkt blijven tot het manken afneemt en mag daarna op gecontroleerde wijze worden uitgebreid.
- **Voedingssupplementen** kunnen aan het voer worden toegevoegd voor verschillende doeleinden.

Behandelen zonder operatie kan in bepaalde gevallen op korte termijn best resultaat opleveren. Maar meestal is een operatie nodig om het manken langdurig te verhelpen.

Operatieve behandeling

Opereren heeft de volgende doelen:

- Het **verwijderen** van de losse kraakbeenfragmenten.
- **Herstel** van het gewrichtskraakbeen stimuleren om zo het degeneratieve proces te vertragen.

Als uw dierenarts of een specialist adviseert om de hond te opereren, dan dient dat zo snel mogelijk te gebeuren. Dit verkleint namelijk de kans op artrose.



TIPS VOOR DE EIGENAAR

- Geef uw hond de medische behandeling zoals voorgeschreven door uw dierenarts om pijn en ontsteking te verminderen en de levenskwaliteit van uw hond te verbeteren.
- Dagelijkse korte, voorzichtig uitgevoerde bewegings-oefeningen op advies van uw dierenarts zijn gunstig voor uw hond omdat ze de mobiliteit van het getroffen gewricht kunnen verbeteren.
- Voorkom dat uw hond te zwaar wordt. Hoogwaardige voeding en beperkte calorie-inname is essentieel voor het behoud van de gezondheid van gewrichten en het algemene welzijn van uw hond.
- Om uw hond te helpen kunt u een speciaal tuigje gebruiken, dat ondersteuning biedt tijdens het wandelen.
- Aanpassing van de leefomgeving zullen dagelijkse activiteiten voor uw hond vergemakkelijken. Zorg bijvoorbeeld voor een comfortabele slaapplek (dik, zacht kussen), een anti-slipmat op gladde vloeren en een loopplank voor de auto.

Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie over de gezondheid van de gewrichten van uw hond.